

สเป็คตราโซล

Spectrazol®



ส่วนประกอบ

ใน 1 กระบอกฉีดยา (3 กรัม) (Single dose syringe) ประกอบด้วย Cefuroxime (as Sodium salt) 250 mg

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ (Clinical mastitis) ในโคนม

ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยา 1 กระบอก ฉีดเข้าทางช่องหัวนม (Teat canal) ของแต่ละเต้านมที่มีการอักเสบติดเชื้อ ทันทีหลังจากการรีดนมทุกครั้ง
- สำหรับการรักษาโดยทั่วไปให้ยานี้ติดต่อกัน 3 ครั้ง เช่น ให้ยา 1 กระบอก ทันทีหลังจากรีดนมทุกครั้ง 12 ชั่วโมง เป็นจำนวน 3 ครั้ง
- หากให้ยาครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่หายดี มีความจำเป็นต้องรักษาต่อ สามารถให้ยาต่อไปได้โดยไม่เกิน 8 ครั้ง

วิธีใช้

- รีดนมจากเต้านมที่มีการอักเสบติดเชื้อทิ้งให้หมดก่อน และเช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวนมด้วยผ้าหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% รอจนแห้งแล้วจึงฉีดยาเข้าทางช่องหัวนมจนหมดหลอด จากนั้นสเปรย์หรือจุ่มหัวนมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดหัวนม (Teat antiseptic)

ขั้นตอนการให้ยา

1. หลังจากรีดนมแล้ว ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณหัวนม และเต้านม
2. ใช้มือจับกระบอกยาให้แน่นจากนั้นหมุนเบาๆ พร้อมกับดึงฝาปิดกระบอกยาออกตรงๆ ไม่ควรบีบปากกระบอกยา และระมัดระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนบริเวณปากกระบอกยา

จัดทำโดย

บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อาคารวังนารายณ์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02-287-9555 โทรสาร : 02-287-9552

3. สอดปากกระบอกยาเข้าไปในช่องหัวนมแล้วดันยาเข้าไปช้าๆ จนหมด จากนั้นนวดคลึงบริเวณหัวนมเบาๆ (นวดขึ้น) เพื่อช่วยให้ยากระจายตัวเข้าเต้านม
4. สเปรย์หรือจุ่มหัวนมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดหัวนม (Teat antiseptic)

ข้อควรระวัง

คำเตือน

- ให้ยาแก่สัตว์ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาข้อมูลการใช้ยาและข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้
- Cefuroxime อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดปฏิกิริยาการแพ้ยาทางผิวหนังได้ ผู้ให้ยาแก่สัตว์ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสยาโดยการใส่ถุงมือ และล้างมือให้สะอาดหลังจากการหยิบจับยานี้
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส และไม่ควรเป็นผู้ให้ยาแก่สัตว์
- หากมีการสัมผัสยาให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาดจำนวนมาก
- หากมีการระคายเคืองผิวหนัง หลังจากสัมผัสยา หรืออาการรุนแรง เช่น การบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก และตา หายใจลำบาก ซึ่งเป็นอาการรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ และนำเอกสารกำกับยาไปด้วย

"โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา"