

# เซฟพราวิน

## Cepravin™ dry cow



### ส่วนประกอบ

ใน 1 หลอด (3 กรัม) (Single dose syringe) ประกอบด้วย Cephalonium 250.0 mg

### สรรพคุณ

ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ (Mastitis) เซฟพราวิน เป็นสูตรยาปฏิชีวนะที่สามารถทำให้ตัวยาคงอยู่ในเต้านมได้นาน

### ข้อบ่งใช้

รักษาโรคเต้านมอักเสบในวัว ระยะพักการรีดนม (dry period)

### ขนาดและวิธีใช้

โดยการฉีดเข้าเต้านม ๗ ละ 1 หลอด ให้ เซฟพราวิน เมื่อหลังหยุดรีดนม ซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการหยุดรีดนม คือ เมื่อแม่วัวให้นมน้อยกว่า 10 ลิตร ต่อวัน ซึ่งในขณะนี้ควรเริ่มลดอาหารลงด้วย หลังจากนั้นให้ เซฟพราวินสอดเข้าเต้านมทุกเต้านมที่หลังการรีดนมครั้งสุดท้าย และในช่วง 1-2 วันแรกหลังใช้ เซฟพราวิน ควรหลีกเลี่ยงการนำแม่วัวเข้าของรีดนมหรือหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้แม่วัวหลังน้ำนม เพราะจะทำให้ตัวยาคงออกมาพร้อมกับน้ำนม

### คำเตือน

- ห้ามใช้ในวัวที่กำลังให้นม (lactating cow)
- ห้ามใช้ภายในระยะ 51 วัน ก่อนคลอด
- น้ำนมเพื่อบริโภคสามารถนำมาใช้บริโภคได้ ภายหลังจากวัวคลอดแล้ว 96 ชั่วโมง
- ห้ามฆ่าสัตว์เพื่อบริโภคภายใน 21 วันหลังให้ยาครั้งสุดท้าย

### การเก็บรักษา

เก็บในที่เย็นและแห้ง, อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C และห้ามแช่แข็ง

“โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา”