

เบเรนิล เวท 7%

Berenil Vet 7%



ลักษณะยาและส่วนประกอบ

ยาฉีดสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทริพาโนซิม, เชื้อบานบีเรีย และเชื้อไอลีเอชีใน 1 มล. ประกอบด้วย ไดมินาเซ็น อะเซทูรัต (Diminazene Aceturate) 70 มก. และ พีนาไซซิน (Phenazone) 375 มก.

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาโรคติดเชื้อด้วยเชื้อในรั้ว, แพะ, แกะ, สุกร, และม้าที่เกิดจากเชื้อที่ໄວต่ออย่างนี้

- โรคติดเชื้อบานบีเรีย (Babesiosis) ที่เกิดจากเชื้อ B. bovis, B. bigemina, B. ovis, B. motasi, B. canis, B. equi
- โรคติดเชื้อทริพาโนซิม (Trypanosomiasis) ที่เกิดจากเชื้อ T. congolense, T. vivax, T. brucei รวมทั้งเชื้อ T. evansi
- โรคติดเชื้อไอลีเอชี (Theileriosis) ที่เกิดจากเชื้อ T. annulata โดยใช้ยาในร่างกาย แรกของ การติดเชื้อ
- โรคที่เกิดจากเชื้อไพร็อตัวที่ໄວต่ออย่างนี้มากกว่า 2 ชนิดรวมกัน

ขนาดยาและวิธีใช้

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหลังๆ บริเวณคอ และสามารถฉีดเข้าใต้ผิวนังได้

- ขนาดยา 5 มล. ต่อน้ำหนักตัว 100 กก.

ในรายที่ติดเชื้อ Tenacious Trypanosomiasis, การติดเชื้อโปรดใช้วิธีต่ออย่างนี้มากกว่า 2 ชนิดรวมกัน, เชื้อไอลีเอชี

- ควรให้ยาในขนาด 2 เท่าปกติ
- ควรแบ่งยาฉีดในที่ต่างกันหลังๆ แห่ง ในรายที่ใช้ยาในปริมาณมากเกินกว่า 5 มล. แต่ไม่เกิน 56 มล. ของขนาดยาทั้งหมด

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30° C และเก็บในที่มืด, ไม่ให้ถูกแสง

ระยะเวลา

หยุดยาอย่างน้อย 20 วันก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อบริโภค

ขนาดบรรจุ

ขนาด 20 มล. และ 90 มล.

“โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา”